

VEILEDENDE DOSERING TIL SLAKTEKYLLING

Livssyklus	Fôr	Start	Vekst	Slutt
	Alder	0-14 dager	14-25 dager	25-32+ dager
Utfordringer		<ul style="list-style-type: none"> Første uke dødelighet Sykdommer (virus og bakterier) Beinproblemer Klekking Sortering/ transport Vaksine Fôr- og vanninntak 	<ul style="list-style-type: none"> Koksidiose Klinisk eller sub-klinisk NE Vått strø Beinproblemer Stress Dårlig næringsstoffopptak Underutviklet immunsystem 	
Målsetning		<ul style="list-style-type: none"> Jevne kull Lav dødelighet Tørt strø Friske dyr 	<ul style="list-style-type: none"> Jevne kull, jevn vekst Lav dødelighet Tørt strø God tilvekst og lav FF Friske dyr 	
CLOSTAT™ HC SP Dry Veil. strategier	Ved høy 1. uke dødelighet	100-150 g/1000 L	50-75 g/1000L	50-75 g/1000L
	Vått strø	75-100 g/1000L	75-100 g/1000L	75-100 g/1000L
	Akutt dødelighet tilknyttet <i>Cl. perfringens</i>	200 g/1000L	200 g/1000L	200 g/1000L
	Generell begrensning av <i>Cl. perfringens</i>	35 g/1000L	35 g/1000L	35 g/1000L



Cultivating Value

Oversikten skal ikke erstatte veterinærbehandling-eller oppfølging. Doseringen vil variere etter fjørferase, alder og miljøbelastningen av *Clostridia perfringens*.

