

# ReCovin pastasystem

- lett, sikkert og effektivt

**ReCovin pastasystem** er et effektivt dietetisk tilskuddsfôr, optimalt tilpasset for den enkelte situasjon. Pastaen absorberes hurtig, og gis enkelt med en ReCovin-pastapistol. Du får ReCovin-pasta ferdigblandet i brukervennlige engangstuber. ReCovin-pistolen har en bajonettkobling som passer til tuben. Tildelingen foregår lett og sikkert av en person og riktig mengde pasta gis direkte i kuas munn.

## ReCovin Calcium pasta



**ReCovin Calcium pasta** er et kalsiumkloridprodukt, som er framstilt etter en patentert prosess, hvor kalsiumkloriden er beskyttet av en tofasert spesialolje som beskytter slimhinnene mot etseskader. I tillegg er det tilsatt smaksstoffer for å dempe den bitre og salte smaken av kalsiumklorid. **ReCovin Calcium pasta** anvendes i perioden rundt kalving til melkekyr, eller etter dyrlegens behandling av melkefeber. **ReCovin Calcium pasta** virker forebyggende mot melkefeber. **ReCovin Calcium pasta** er bestående av 4 tuber som gir 2 behandlinger.

### Bruksanvisning:

1 tube ved kalving  
½ tube 6 — 8 timer etter kalving  
½ tube 16 — 20 timer etter kalving

Syke dyr skal alltid ha tilsyn av veterinær.

Holdbarhet: 18 mnd. fra prod.datato

## ReCovin Vomstarter pasta



**ReCovin Vomstarter pasta** er en unik sammensatt pasta av næringsstoffer og essensielle vitaminer, mineraler og aminosyrer, og fungerer som substrat for vommas mikroflora. Fôrtilskuddet er velegnet etter perioder med nedsatt etelyst og vomforstyrrelser. Dietisk tilskuddsfôr til storfe, sau og geit-til behandling av sur vom. **ReCovin Vomstarter pasta** leveres i pakker på 4 tuber.

### Bruksanvisning:

Voksne kyr: 1/2 tube 2 x daglig i 3-4 dager  
Kalv: 1/4 tube 2 x daglig i 3-4 dager  
Sau og geit: 1/4 tube 2 x daglig i 3-4 dager

Syke dyr skal alltid ha tilsyn av veterinær.

Holdbarhet: 18 mnd. fra prod.datato



## ReCovin Ketose pasta



**Ketose** er en produksjonssykdom hos melkekyr og inntreffer i den første delen av laktasjonen. Ketose er relatert til føring og oppstår når melkekoa får tilført for lite energi i forhold til behovet. Kua begynner å bryte ned fettreservene i kroppen og det blir dannet noe som heter ketoner. Et stort underskudd av energi fører til en sterk nedbryting av fett og opphopning av ketoner i kroppen. Begynnende tegn på ketose er dårligere appetitt og kua vraker ofte kraftfôret.

**ReCovin Ketose pasta** gis til melkekuer i negativ energibalanse, der det er fare for ketose. Tilskuddet har et høyt energiinnhold og er tilsatt vitaminer og mineraler. En pakke består av 4 tuber.

### Bruksanvisning:

1 tube 2 ganger daglig i tre dager.

Syke dyr skal alltid ha tilsyn av veterinær.

Holdbarhet: 18 mnd. fra prod.datum

## Tildeling av ReCovin pasta

### Doseringsveiledning:

Plastikkuben spennes fast i pistolens bajonettkobling. Ved å gripe munnviken med den ledige hånden kan kuas munn åpnes og plastikkubens spiss føres inn mot tungen. Det er viktig at tuben ligger

parallelt med og oppå tungen. Når bajonettkoblingen på pistolen er like utenfor fortennene på kua (se tegning) er plasseringen av pastatuben korrekt og man kan begynne å gi pasta. Gi kua tid til å svelge hver dose som doseres ut for hvert pumpetrykk. Følg kuas hodebevegelser slik at spissen på tuben forblir på tungenroten.



1. Grip kua i munnviken med den ledige hånden.
2. Før tuben inn parallelt med tungen inntil koblingen på doseringspistolen er like utenfor fortennene.
3. Start doseringen og doser i takt med kuas svelgerefleks (hver gang kua svelger), lukkes strupelokket for luftrøret, og pastaen føres direkte ned i spiserøret.
4. Start aldri doseringen hvis pastatuben ikke ligger parallelt med og oppå tungen.

### Se tegningen:



1. Grip kua i munnviken med den frie hånd, og før tuben inn mellom fortænderne.



2. Før tuben inn parallelt med tungen, inntil fâringen af doseringspistolen er ud for fortænderne.



3. Start dosering og dosér i takt med kuens synkebevægelser (hver gang kua synker, lukker strubeløget for luftrøret, og pastaen føres direkte ned i spiserøret).



4. Start aldrig doseringen, hvis tuben ikke ligger parallelt med tungen!