

Vilo BACTOCELL[®] 75



Vilo BACTOCELL[®] 75 - et tilskuddsfôr til våtfôring av svin.

Uønsket groing av bakterier, gjær og mugg i våtfôringsanlegget til svin kan gi problemer med appetitt, reproduksjon, diare og andre mer diffuse helseproblemer.

- Vilo BACTOCELL 75 hindrer oppblomstring og vekst av gjær, mugg, enterobakterier, coli og andre patogene bakterier i våtfôret til svin
- Styrer den mikrobiologiske kvaliteten av fôret ved produksjon av melkesyre
- Produksjon av melkesyre gir en frisk og syrlig smak

Gir god respons hos grisene og er enkel i bruk

- Økt tilvekst og fôrutnytting
- Friskere griser og lavere dødelighet

Mikrobiologisk undersøkelse av vårfôr

	Bactocell	Kontroll
Melkesyrebakterier	$5,4 \times 10^8$	$2,3 \times 10^8$
Pediococcus	$2,8 \times 10^8$	-
Clostridier	10	17
Coliforme	340	27 200
Enterobakterier	480	153 000

ADRIA-Normandie, France 2001

Sammensetning


Bactocell (4b1712)
MCP
Varmebehandlet hvete
Olje

Analyse:

Råprotein	0,5 %
Råfett	1,1 %
Trevler	0,1 %
Aske	16 %
Kalsium	2,4 %
Fosfor	3,4 %
Natrium	0,0 %
Lysin	0,02 %
Metionin	0,01 %

Mikroorganismer pr. kg:

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M
Min 1×10^9 cfu/kg



Vilo BACTOCELL® 75



Bruksanvisning

1. Før første gangs bruk

- Rengjør våtføringsanlegget grundig.
- Vask anlegget med et surt rengjøringsmiddel etterfulgt av et desinfeksjonsmiddel med peroxid for å fjerne fett og forrester i biofilmen
- Skyll grundig med vann for å fjerne urenheter og rester av desinfeksjonsmiddel

2. Oppstart (første doseringer)

- Etter vask, desinfeksjon og skylling, startes anlegget
- Tilsett 400 gram Vilo BACTOCELL 75 pr tonn tørt fôr de tre første dagene

3. Kontinuerlig bruk

- Tilsett 135 gram Vilo BACTOCELL 75 pr tonn tørt fôr i blandingene heretter for å holde den gode biofilmen og den mikrobiologiske fôr kvaliteten under kontroll
- Regelmessig rengjøring av våtfortanken er nødvendig også når en bruker tilsetning av melkesyrebakterier
- Det anbefales å dosere fra en automatisk mikrodoserer på toppen av blandetanken. Alternativt må en manuelt måle ut riktige mengder Vilo BACTOCELL 75 og tilsette til hver eneste fôrblanding



Generelt

- Bland ikke Vilo BACTOCELL 75 ut i vann, før den tilsettes blandetanken
- Bland i Vilo BACTOCELL 75 tidlig i blandeprosessen (etter vann, men før første fôringrediens) og øk gjerne blandetiden med 4-5 minutter (ved bruk av pelletert ferdigfôr) for å tillate melkesyrebakteriene å vekkes til live før fôret tildeles
- Ideell pH i våtfôret etter kort fermentering i blandetanken er ca 5,0
- Våtfôr med Vilo BACTOCELL 75 bør brukes i løpet av et døgn

